

Psychology 8 part 2

Bipolar Disorder

النشاط عندهم مرتفع بشكل غير طبيعي و سريعين الانفعال لدرجة انهم الأكثر عرضة للإصابة بال accidents

Mania

vs

hypomania

elevated irritable mood
cause by marked impairment

ممکن تكون الأعراض لمدة

تحت أربع أيام

like mania but its
mood disturbance is not
severe enough to cause
marked impairment

تكون الأعراض أربع أيام أو
أكثر

كيف أحكم على المريض انه مصاب ب cyclothymic in bipolar disorder ؟


1 ما وصل لمرحلة ال mania

2 سنتين على الأقل

3 ما بمر شهرين على المريض دون أي signs or symptoms

- Euphoria is more common in hypomania

Diagnostic criteria by symptom duration



from slide 27

كيف أحكم على الشخص انه عنده manic episode ؟

1 أعراضه تستمر لمدة أسبوع على الأقل

2 At least three of the following symptoms

Management and Treatment

Anti-manic : treats acute manic episodes and prevents relapse

The most common drug for bipolar disorder is lithium carbonate .

→ normal levels of lithium is (0.6 – 1.2) mEq/L .

→ normal levels of lithium when using lithium drugs is (0.6 – 1.5) mEq/L و هذا الرقم يلي أثناء استخدامه للدواء مسموح انه فقط يوصل اله (ضمن الطبيعي)

→ Toxic levels :

- Mild : (1.5 – 2) mEq/L
- Moderate : (2 – 3.5) mEq/L
- Severe : (> 3.5) mEq/L

Lithium level لازم اشوف ال

من 2 الى 3 مرات بالاسبوع إلى حين
الوصول إلى ال therapeutic dose

وهي ال (normal dose)

بعديها بصير اشوفه مرة بالشهر و أتأكد

*و بسبب أن الليثيوم يغير نقل أيونات الصوديوم في الخلايا العصبية (دائما معه NA) (balance)
وجب عليه بالمقابل أن يزيد من تناول الأطعمة التي تحتوي على الصوديوم NA و يشرب سوائل كثير .