

\*psychology → (behaviors)

\*psychiatry → disorder and its treatment

أي معيار على أساسه نشخص المريض اذا كان معه قلق او → DSM ....

\*neurosis → اضطراب عصبي، التعامل معهم أسهل لانه مدركين لأعراضهم وقادرين بمعالجوا

\*psychosis → اضطراب عقلي وبكونوا على مبدأ

نقطة ثابتة كاذبة مثل لما يكون مصمم انه في شخص قاعد على الكرسي بالرغم من انها : (\*false constant trust )  
فاضية والتعامل معهم كثير صعب

evidence-Based practice → تعتمد اعتماد كبير على ال back ground cultures وال الشخص

\*counseling: ( from health care provider (doctor, psychologist) to patient)

ex: when doctor or health care provider give alternatives about family planning 1, 2, 3.

فالقصد هنا انه الدارسين علم نفس بعطوا counseling about some therapies

\*consultation ( استشارة): نفس ال level

تكون بين اثنين من نفس المستوى يعني طبيب باطني طلب استشارة من طبيب قلب لهم نفس المستوى بس مش نفس التخصص  
Ex: when doctor or health care provider give alternatives about family planning 1, 2, 3.

\*in psychiatry: فقط الطبيب الذي يختص بعلم النفس له الحق بالقيام بالتشخيص أما ال :

العادي الي درس علم نفس ومش طبيب لا يجوز له القيام بالتشخيص Psychologist

\* (case manager) ← الذي يعمل بال (social work) اسمه

\* psychiatric nursing → authorized to give medication ( تكونوا دارسين ماجستير صحة نفسية )

\*psychologist → ممنوع يعطوا دوا

أهم النقاط التي ذكرها الدكتور: \*\*history:

الأمراض النفسية كان يعتقد انه سببها الأرواح الشريرة ( evil spirits )

(syndrome → group of symptoms)

DSM (diagnostic and statistical manual for mental

illnesses → use 5 codes of version

ICD (international classification of disorders) → use 10 codes

of versions

\*\*\* both of them are used for classification of disorders to reduce the disease burden by using criteria

\*PTSD symptoms (post traumatic stress disorder) started after first and second world war, between soldiers

